

MAT Kombi 50122

Milch austausch-Aleinärfuttermittel für Aufzuchtkäbber

Analytische Bestandteile:

22,00 %	Rohtprotein	18,00 %	Rohtfett	0,10 %	Rohtfaser
6,20 %	Rohtschach	1,05 %	Calcium	0,80 %	Phosphor
0,50 %	Natrium	25000,00	1.E./kg Vitamin A		

Zusammensetzung: Enthält 50% Magermilchpulver

Magermilchpulver, Milchnebenzeugnisse, Molkenpulver, Pflanzenfett raff. (Palm/Kokos), Weizenproteinkonzentrat hydrolisiert, Molkenpulver teilentzuckert

Zusatzstoffe je kg Mischfutter: Ernährungshygiologische Zusatzstoffe:

Vitamin A (3a672a)	12 000 I.E.	Vitamin D3 (3a671)	5 250 I.E.
Vitamin E (a1)	450 mg	Vitamin C (3a300)	150 mg
rac-Alpha-Tocopherylacetat(3a700)			

Vitamin E, Provitamine und chemisch definierte Stoffe mit ähnlicher Wirkung

Verbindung von Spurenelementen:

Eisen als Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat (3b103)	50 mg	Eisen als Eisen-(II)-Glycinchelat-Hydrat (3b108)	50 mg
Kupfer als Kupfer als Kupfer-(II)-Glycinchelat-Hydrat (3b413)	4 mg	Zink als Zinkoxid (3b603)	64 mg
Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503)	64 mg	Selen als Natriumselenit (3b801)	0,3 mg
Jod als Calciumjodid, wasserfrei (3b202)	0,16 mg		

Technologische Zusatzstoffe: Calciumpropionat (1a282) 300 mg, Calciumformiat (1a238) 7 000 mg, BHT (E321) 9,84 mg, BHA (1b320) 0,18 mg, Propylgalat (E310) 0,08 mg,

Zootechnische Zusatzstoffe 1,2 Mfd. KBE Enterococcus faecium W74 @ (NCIMB11181), EC-Id Nummer 4b 1708-PUCOFERM

Anerkennungs-Nr.: alpha DE-BY-1-00071

Kennnummer der Partie: 320

Hersteldatum: 11/2023

Halbjar nach Herstellung mind. Monate: 9

Netto Masse: 25 kg



Hersteller: Franz Egenberger GmbH Milchwerk

Herzog-Tassilo-Str. 14 86672 Theilhaupten
Tel. 08271 8167-0 Fax 08271 8167-77
Info@egenberger.eu

(Thermometer verwenden)

Amühtemperatur: 40-45°C
Tranktemperatur: 38-39°C

Klassischer Tränkeplan : Aufzucht

1. - 2. Tag:	MAT-Konzentration (g/l) = 110	Menge: 5 Liter a uf 6 Liter enöhren
3. - 21. Tag:	MAT-Konzentration (g/l) = 110-125	Menge: 6 Liter
21. - 35. Tag:	MAT-Konzentration (g/l) = 125	Menge: linear abnehmend von 6 a uf 4 Liter
36. - 53. Tag:	MAT-Konzentration (g/l) = 125	Menge: linear abnehmend von 4 a uf 2 Liter
53. - 63. Tag:	MAT-Konzentration (g/l) = 125	Menge: linear abnehmend von 2 a uf 0 Liter
≈ 30 kg MAT/Kalb		

Oben angegebene Tränkemengen sind auf zwei Mahlzeiten zu verteilen. Ab der 1. Lebenswoche Heu und Kraftfütter zur freien Aufnahme anbieten, jedoch nicht mehr als 2 kg. Kraftfütter je Tier/Tag verabreichen. Wasser muss den Tieren ab der 2. Lebenswoche zur freien Aufnahme zur Verfügung stehen.

Eine Tränkekonzentration in der frühen Aufzuchtphase von 160 g MAT/liter Wasser anstoft 125 g/liter in den ersten Lebensmonaten führt zu einer verbesserten Wochstumleistung.

→ Metabolische Programmierung

Beispiel für eine Aufzucht gemäß der „metabolischen Programmierung (mit mind. 20% MMR).

1. - 28. Tag:	MAT-Konzentration (g/l) = 160	Menge: 6 Liter
29. - 31. Tag:	MAT-Konzentration (g/l) = 160-120	Menge: 6 Liter
31. - 63. Tag:	MAT-Konzentration (g/l) = 120	Menge: linear abnehmend von 6 a uf 2
≈ 44 kg MAT/Kalb		

(Quelle: Empfehlungen zur Tränke von Jungen Aufzuchtkäbber mit Milchdauerauschem (DLG-Arbeitskreis Fütterführung)

***Anmerkung zu g/l:**
1000ml (=1liter fertige Tränke) / Menge Pulver in Gramm = benötigte Menge Wasser in ml
Beispiel:
160g Pulver + 840 ml Wasser = 1 Liter fertige Tränke
150g Pulver + 850 ml Wasser = 1 Liter fertige Tränke
120g Pulver + 880 ml Wasser = 1 Liter fertige Tränke

Wichtig! Nur frisch zubereitete Tränke verfüttern, da Tränkeester leicht ansauer werden können!

Die gleichzeitige Verwendung verschiedener organischer Säuren oder ihrer Salze ist kontraindiziert, wenn für eines) oder mehrere davon der zulässige Höchstgehalt erreicht oder nahezu erreicht ist.
Hinweis: Alkoholisieralkoholseider setzt ordnungsgemäße und handelsübliche Aufbewahrung voraus. Dazn gehört insbesondere typischerweise Kühe und trockenere Lägerung

Fütterungshinweis: Dieses Futter darf nur an Käbber bis zu einem Alter von 6 Monaten verfüttert werden.

pastus* AMA-Gütesiegel tauglich