

Taumil 25 Lamm

Milch austausch-Aleinfuttermittel für Schaflämmer

Analytische Bestandteile:

23,00 %	Roheprotein	23,00 %	Roheit	0,10 %	Rohfaser
6,20 %	Roheasche	1,05 %	Calcium	0,70 %	Phosphor
0,40 %	Natrium	25000,00	1.E./kg Vitamin A		

Zusammensetzung: Enthält 50% Magermilchpulver

Magermilchpulver, Pflanzenfett raff. (Palm/Kokos), Molkenpulver, Weizenproteinkonzentrat hydrolysiert, Molkenpulver teilentzuckert

Zusatzstoffe je kg Mischfutter: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:

Vitamine, Provitamine und chemisch definierte Stoffe mit ähnlicher Wirkung			
Vitamin A (3a672a)	18.000 I.E.	Vitamin D3 (3a671)	4.000 I.E.
Vitamin E (all)	100 mg	Vitamin C (3a300)	150 mg
rac-Alpha-Tocopherylacetat(3a700)			

Verbindung von Spurenelementen:

Eisen als Eisen-(II)-sulfat Monohydrat (3b103)	50 mg	Eisen als Eisen-(II)-Glycinchelat-Hydrat (3b108)	50 mg
Zink als Zinkoxid (3b603)	40 mg	Mangan als Mangan-(II)-sulfat Monohydrat (3b503)	40 mg
Selen als Natriumselenit (3b801)	0,4 mg	Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202)	0,5 mg

Technologische Zusatzstoffe: Calciumpropionat (1a282) 300 mg, Calciumformiat (1a238) 5.000 mg, BHT (E321) 23,68 mg, BHA (1b320) 0,18 mg, Propylgallat (E310) 1,33 mg,

Anerkennungs-Nr. alpha DE-BY-1-00071

Kennnummer der Partie: 219

Hersteldatum: 08/2023

Haltbar nach Herstellung mind. Monate: 9

Netto Masse: 25 kg



Vertrieb: Taumil Vermarktungs GmbH

Baumenstraße 9 A-4600 Weis
Tel: +43 664 100 8483 www.taumil.at

FÜTTERUNGSANLEITUNG

(Thermometer verwenden)

Anrührtemperatur: 50°C
Tränketemperatur: 38°C - 40°C.

Über Sauger verfüttern. Nur saubere Gefäße für die Tränkezubereitung verwenden.

TRÄNKEPLAN LÄMMERAUZUCHT

LEBENSWOCHE	LITER TRÄNKE pro Tier und Tag	TRÄNKEKONZENTRATION Gramm pro Liter Tränke
1. bis 5. Lebentag : Bestmilch	0,5-1	-
1.Lebenswoche(6.u.7.Lebentag)	0,5-1	150-200
2. Lebenswoche	1,5	150-200
3. bis 6. Lebenswoche	2,5	150-200

Bei mutterlosen Tieren kann die Milch austauschertränke sofort nach Verabreichung der Bestmilch anderer Muttertiere ab dem 2.Lebentag verabreicht werden.

Die Tränke sollte ca. 3 - 4 Mal pro Tag an die Lämmer verabreicht werden. Der Angewöhnung der Lämmer an die Sauger ist erhöhte Aufmerksamkeit zu schenken. Neben der Milch austauschertränke soll ab der 2. Lebenswoche Lämmerstarter, Heu und Wasser zur freien Aufnahme angeboten werden.

Die gleichzeitige Verwendung verschiedener organischer Säuren oder ihrer Salze ist kontraindiziert, wenn für eines(s) oder mehrere davon der zulässige Höchstgehalt erreicht oder nahezu erreicht ist.

Hinweis: Aldehydharzharzklebstoffe setzt ordnungsgemäße und handelsübliche Aufbewahrung voraus. Dazu gehört insbesondere typenspezifische Kühlung und trockene Lagerung

pastus* | AMA-Gütesiegel tauglich